

全市新冠疫苗“加强针”开打

18岁以上接种满6个月可打 已完成接种1.96万余人

本报讯(全媒体记者 白萍) 10月9日上午,市民倪长城来到宜秀区大桥街道卫生服务中心接种了新冠疫苗“加强针”。记者从市疾控中心获悉,当天起,我市全面启动新冠疫苗“加强针”接种工作。

18岁以上接种满6个月可打“加强针”

宜秀区大桥街道卫生服务中心主任程木生告诉记者:“新冠疫苗‘加强针’的接种对象为18岁以上,接种了两针剂灭活疫苗的第二针和一针剂腺病毒疫苗满六个月的人群。”

记者了解到,该中心对接种系统里符合条件的1180名接种者均发送了接种“加强针”的短信通知。10月9日开打首日,共为80余人接种了新冠疫苗“加强针”。

记者从市疾控中心了解到,截至10月10日16时,我市符合“加强针”接种条件的共有7.7万余人,全市已完成接种1.96万余人。

关注短信通知和安康码 及时完成接种

“加强针”是全新的疫苗吗?打了三针剂新冠疫苗和12-17岁符合

接种条件的群体要接种“加强针”吗?

“根据国家和省市统一部署,我市开展‘加强针’的接种工作,所用针剂和前期接种的疫苗是完全一样的,接种程序、禁忌等也和之前相同。”市疾控中心免疫规划科科长万江顺表示,“接种过三针剂疫苗和12-17岁的接种群体,目前还没有接种‘加强针’的安排,需等下一步通知。”

市疾控中心提醒,广大符合接种“加强针”条件的市民可及时关注社区和各接种点发布的短信通知或者查看安康码查询自己距离新冠疫苗接种完成是否已满6个月。目前,我市“加强针”库存充足,大家可就近到接种点完成“加强针”的接种。

——【新闻延伸】——

1.什么是加强针?

加强针是指在完成疫苗接种后,根据抗体消退的情况进行补充接种,保持人体对病毒免疫力的疫苗剂次。在乙肝、流感、狂犬病等传染病疫苗接种中使用加强针的做法比较常见。

2.为什么要打加强针?

随着新冠病毒疫苗在全球的大规模接种,各国及疫苗生产企业

积累了更多的真实世界接种数据,加上各地陆续出现的突破性病例,对于疫苗加强针的关注度越来越高。

钟南山指出,灭活疫苗或mRNA疫苗接种之后半年,免疫功能都有明显的下降。

在一定时间后接种加强针成为提高免疫能力的备选方案之一。近期,国药中生、北京科兴陆续发布了针对新冠疫苗加强针的研究结果。

3.打过加强针后效果怎么样?

可提升保护效果。根据相关研究发现,接种疫苗第二剂后6个月再接种一剂,抗体水平增幅达到十多倍。接种后,再过6个月还能维持在比较高的水平。

4.加强针能选不同技术路线的疫苗吗?

建议使用同一个疫苗产品完成接种。例如,已完成2针次的灭活疫苗接种,那么,第三针也要接种灭活疫苗。

5.加强针安全吗?

安全。近期,国药中生、北京科兴分别发布了新冠疫苗加强针的研究结果,证明接种第三针仍然像接种第一针和第二针一样安全。

前8个月召回 缺陷消费品1.3万余件 涉及口罩、纸杯纸碗、 数字移动电话等

本报讯(全媒体记者 徐侃 通讯员 周毅) 1至8月份,我市召回缺陷消费品1.3万余件,发布召回公告13次。召回产品涉及浸渍纸层木质地板、口罩、纸杯纸碗、数字移动电话等5个类别。

近年来,市市场监管局始终将缺陷产品召回工作作为推进质量提升的重要抓手,认真贯彻落实“上下联动、齐抓共管”的工作理念,探索形成了“市局统筹协调、分中心技术支持、基层协同参与”的缺陷产品召回工作新格局。同时积极引导企业树立“召回的是缺陷消费品,体现的是责任和担当,赢得的是信誉和市场”的召回理念,通过网络、微信微博、新媒体、报纸专栏等形式,加大缺陷召回宣传力度,举办缺陷产品召回法规制度宣贯培训会,进一步提高市场监管人员的指导能力和企业的主体责任意识,进一步完善产品召回管理工作机制,指导县(市、区)加强缺陷产品召回工作,从源头上消除缺陷隐患,为保障消费者人身安全,履行社会责任,发挥了积极作用。

我市将全面贯彻落实《安徽省消费品召回管理暂行办法》,通过持续开展缺陷产品召回,特别是重点关注高风险缺陷产品的召回工作,做实、做细、做好防风险、保安全、守底线工作,助力高质量发展。

市疾控中心发布提醒

主动报备重点地区旅居史 做好健康监测

本报讯(全媒体记者 白萍) 国庆假期后,旅游、外出人员陆续返家或返回工作岗位。10月8日,市疾控中心发布提醒,广大市民要主动报备重点地区旅居史,做好自我健康监测,非必要不前往涉疫地区,还未完成新冠疫苗接种的应尽快接种。

市疾控中心提醒,近14天内,

有新疆伊犁州霍尔果斯市、可克达拉市旅居史者,应主动向所在社区(村)、单位报备,并配合当地做好核酸检测、健康监测等防疫措施。旅行、外出归来后,如果发现自己近14天内曾到过疫情发生地区或与公布的感染者活动轨迹有交集的,应主动向社区(村)、单位报备,配合做好核酸检测、医学观察等疫

情防控措施。

旅行、外出归来应自我健康监测14天,期间尽量减少与他人接触,减少聚会、聚餐等活动。一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退等症状,要提高警惕,及时前往发热门诊就诊,并主动告知医生旅居史。就诊途中应做好个人防护,尽量避免乘坐公共交通工具。

厉行勤俭节约

拒绝餐饮浪费

