

# 推动不同文明交流对话

## 中国与联合国教科文组织续签长城奖学金计划

新华社巴黎6月17日电 正在法国巴黎出席联合国教科文组织2030年教育高级别指导委员会会议的中国教育部部长怀进鹏17日在联合国教科文组织总部与该组织总干事阿祖莱续签《中华人民共和国教育部与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)关于教科文组织/中华人民共和国共同赞助长城奖学金计

划的谅解备忘录》。

阿祖莱高度赞赏中方与联合国教科文组织长期以来的密切合作,认为双方在教育领域有诸多互相契合的理念,长城奖学金计划是双方在教育领域合作的成功典范。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育、中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威、联合

国教科文组织副总干事曲星、联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼当天共同见证续签仪式。

长城奖学金计划由中国教育部和联合国教科文组织于1994年共同设立,每年共同支持75名发展中国家青年学生学者赴华,以普通进修生或高级进修生的身份在中国高校进

行为期一年的本科和研究生阶段学习和研究。

据介绍,本次续签备忘录的有效期为5年。协议的续签将进一步扩大该计划在全球范围内的影响力,让更多发展中国家尤其是非洲与小岛屿国家的青年学者和研究人员有机会到中国学习,深化中外学者学术互鉴,推动不同文明交流对话。

### 奇利马被安葬在其家乡

6月16日,人们在马拉维首都利隆圭的宾古国家体育场悼念已故副总统奇利马。

马拉维17日将因飞机失事遇难的副总统奇利马安葬在其家乡恩切乌地区的恩西佩村。16日,奇利马的遗体被安置在首都利隆圭的宾古国家体育场供公众瞻仰,随后于当天下午被运送至安葬地。大批民众聚集到体育场和街道两旁为奇利马送行。

新华社发



### 《经济学人》：中国科研实力增长迅速

新华社伦敦6月17日电 英国《经济学人》周刊日前刊文说,中国科研实力增长迅速,在多个领域已处于国际前沿。但文章同时指出,中国科研领域仍存在一些短板。

文章介绍说,从高影响力论文,即经常被同行引用的论文,可以看出趋势变化。2013年,美国高影响力论文数量约为中国的4倍;2022年以来,中国高影响力论文数量已超过美国。另据反映全球高质量科研产出及合作情况的自然指数,2023年中国作者在高质量期刊上发表的论文份额全球排名第一。

文章说,据有关科研产出的荷兰莱顿大学排名,目前中国有6所大学或机构进入世界前10;自然指数公布的全球科研机构排名也显示,中国有7所大学或机构进入前10。

文章说,美国和欧洲在普通生物学和医学领域仍然遥遥领先,但中国在物理学、化学、地球和环境科学领域已发展至世界顶尖水平,且应用研究是中国的强项。

文章指出,中国从资金、设备和人才着手提升科研实力,在尖端研究方面的增长没有放缓迹象,但中国科研领域仍存在一些短板,如非一流大学的科研产出质量仍有待提高,基础研究与西方国家仍有差距、企业内部基础研究匮乏等。

### 芬兰财政部预测今年芬经济零增长

新华社赫尔辛基6月17日电 芬兰财政部17日发布的最新经济预测显示,2024年芬兰经济增速将为零,2025年、2026年将分别增长1.6%和1.5%。

芬兰财政部表示,随着全球经济前景改善和世界贸易复苏,预计芬兰出口形势将逐步好转。通胀放缓和利率下降将推动私人消费增长,建筑业也将逐渐复苏。同时,能源转型等投资增加将促进整体投资增长。基于这些因素,预计明后两年芬兰经济将实现增长。

## 正在日本蔓延的“食人菌”感染症是什么

日本国立感染症研究所18日公布的统计数据显示,截至6月9日,日本今年报告的链球菌中毒休克综合征(俗称“食人菌”感染症)病例数累计破千,达1019例,超过去年全年的941例,创历史纪录。

这种名字听起来很可怕的感染症究竟是什么?为什么今年病例特别多?如何预防“食人菌”感染?

### “食人菌”感染症是什么

日本国立感染症研究所的资料介绍,链球菌中毒休克综合征是一种突然发病的、由溶血性链球菌引发的败血性休克。初期症状一般是咽喉疼痛、发烧以及食欲不振、腹泻、呕吐等消化道症状,还有低血压等败血症症状,继而可出现软组织病变、呼吸衰竭、肝功能衰竭、肾功能衰竭等多脏器衰竭。患者从出现症状到发展为休克和多脏器衰竭只需要24至48小时,且致死率高达30%,因此其致病菌在日本被称为“食人菌”。

实际上,溶血性链球菌是一种常见细菌,每年冬春季在儿童中流行的链球菌性咽炎,以及夏秋季儿童易感染的传染性脓疱病和猩红热都是由溶血性链球菌引发的。链球菌中毒休克综合征是链球菌所致侵袭性感染中最严重类型。

那么常见的致病菌为何会导致更为严重的后果呢?一般认为宿主

对于链球菌产生的肠毒素的免疫过激反应是“食人菌”感染症高致死率的原因之一。链球菌中毒休克综合征患者病程发展迅速,并常因呼吸衰竭出现急性呼吸窘迫综合征,导致约三成患者即便得到救治依然死亡。

### 为何今年感染病例特别多

“食人菌”感染症并不是一种新型感染症。根据日本国立感染症研究所的资料,美国1987年报告了首例病例,之后,欧洲、亚洲也报告了病例。日本最初的典型病例报告于1992年,此后每年确诊病例约一两例。造成感染的主要病原体是A群溶血性链球菌。

该研究所3月底发布的一份报告显示,与此前相比,今年以来由A群溶血性链球菌引发的“食人菌”感染症病例数大幅上升,达到60%。从A群溶血性链球菌感染者分离的菌株看,其中约半数是M1UK谱系菌株,这种菌株的毒素产生量多,容易传播。

此外,溶血性链球菌感染的流行也被认为是“食人菌”感染症病例增加的一个原因。据该研究所18日发布的数据,6月3日至9日这一周,日本全国定点医疗机构平均报告A群溶血性链球菌性咽炎4.87例,是2023年同期的约3倍。可以看出,溶血性链球菌感染目前在日

本处于全国流行的状态。

### 哪些人群容易感染,如何预防

日本国立感染症研究所介绍说,“食人菌”感染症感染途径一般为经鼻腔、咽喉黏膜的飞沫传播和经伤口等的接触传播,因此原本就有溃疡性皮肤病疾病的人、最近接受过手术的人、最近感染过带状疱疹和水痘等容易导致皮肤溃烂的疾病的人、有糖尿病等基础疾病的人、有酒精依赖症的人、常用止痛片或非甾体抗炎药的人需要格外注意。

与咽炎等普通溶血性链球菌感染症易感染儿童不同,“食人菌”感染症多发于30岁以上的成年人。日本今年以来50岁以上感染者人数增多,尤其70岁以上的感染者人数比往年出现了大幅上升。日本专家表示,今年年龄越大的人群越需要防范“食人菌”。

因为“食人菌”感染症病情发展非常快,早发现早治疗非常关键,但是感染的初期症状易被误诊为感冒。日本专家说,“食人菌”感染症的一个特别症状是疼痛,而且多发生于四肢。因此,要关注有无手脚疼痛和肿胀,有比较强烈的咽喉疼痛也不要置之不理。如果出现高烧谵妄或者伤口红肿快速扩散,应立即前往医院。此外,勤洗手、戴口罩等日常防护措施对预防感染也有效。

新华社东京6月18日电